

ডে কেয়ার, প্রি-কে এবং গ্রেড স্কুলে উপস্থিতির জন্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তা

নিউ ইয়র্ক স্টেটে, পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই স্কুল বা ডে কেয়ারের প্রথম দিন থেকে
১৪ দিনের মধ্যে একটি শিশুর সময়োপযোগী ভ্যাকসিন নেয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে।
আরও জানতে, ডিসিট করুনঃ
<https://on.ny.gov/3WIIzX8>

স্কুল বা ডে কেয়ারের প্রথম দিনের ১৪ দিনের মধ্যে, যত্নশীলদের অবশ্যই:

- তাদের সন্তানের সময়োপযোগী টিকা দেওয়ার প্রমাণ দেখান, বা
- ভ্যাকসিনেশন থেকে একটি বৈধ চিকিৎসা ছাড় প্রদান করুন।

স্কুল বা ডে কেয়ারে উপস্থিত থাকতে বা থাকার জন্য, যে সমস্ত বাচ্চাদের
টিকা দেওয়া হয়নি বা অপ্রয়োজনীয় তাদের অবশ্যই প্রথম ১৪ দিনের মধ্যে
সমস্ত প্রয়োজনীয় টিকার প্রথম ডোজ পেতে হবে। টিকা দেওয়ার সিরিজ
সম্পূর্ণ করার ১৪ দিনের মধ্যে সিরিজের পরবর্তী ভ্যাকসিনগুলিও তাদের
অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।



শিশুদের জন্য ভ্যাকসিনগুলিকে কম চাপযুক্ত
করতে সহায়তার জন্য, CDC থেকে এই
টিপসগুলি
দেখুন:
bit.ly/vaccineslessstressful

✓ প্রতি গ্রীষ্মের প্রথম দিকে আপনার স্কুল চেক-আপ অ্যাপয়েন্টমেন্টে ফিরে যান!

ডে কেয়ার, প্রি-কে, এবং স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন
ডিপথেরিয়া এবং টিটেনাস টক্সিলিনিক্স ভ্যাকসিন এবং পারটুসিস ভ্যাকসিন (DTaP বা
Tdap)

- হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন
- হাম, মাম্পস এবং রুবেলা ভ্যাকসিন (এমএমআর)
- পোলিও টিকা
- ভেরিসেলা (চিকেনপেস্তা) ভ্যাকসিন

ডে কেয়ার এবং প্রি-কে-এর জন্য অতিরিক্ত ভ্যাকসিন প্রয়োজন
• হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি কনজুগেট ভ্যাকসিন (Hib)

- নিউমোকোকাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পিসিভি)

মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত টিকা
প্রয়োজন

- ৬-১২ গ্রেডের জন্য Tdap ভ্যাকসিন
- ৭-১২ গ্রেডের জন্য মেনিনোকোকাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (MenACWY)
- ১২তম গ্রেডের ছাত্রদের তাদের ১৬ তম জন্মদিনে বা তার পরে MenACWY এর
একটি অতিরিক্ত বুস্টার ডোজ প্রয়োজন

NYSIIS

নিউ ইয়র্ক স্টেট ইমিউনাইজেশন
ইনফরমেশন সিস্টেম হল কেন্দ্রীয়
ডিজিটাল সিস্টেম যেখানে স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানকারীরা আপনি কী টিকা পেয়েছেন
সে সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করান। এই তথ্য
স্কুল এবং হাসপাতালের পাশাপাশি স্বাস্থ্য
বিভাগের কাছে উপলব্ধ। আপনার NYSIIS
প্রোফাইলে আপনি কোন টিকা পেয়েছেন
এবং কোনটির জন্য আপনার এখনও
প্রয়োজন বা বুস্টার প্রয়োজন সে সম্পর্কে
সবচেয়ে সঠিক তথ্য থাকা উচিত।

নিউইয়র্ক স্টেটে ভ্যাকসিন সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য, দেখুন: [HEALTH.NY.GOV/PREVENTION/IMMUNIZATION](https://health.ny.gov/Prevention/Immunization)



Erie County
Department of
Health
ইরি কাউন্টি স্বাস্থ্য বিভাগ



Public Health
Public Health
Public Health

হেলথ ইকুইটি অফিস
www.erie.gov/health-equity

2025-26 School Year

New York State Immunization Requirements for School Entrance/Attendance¹

NOTES:

All children must be age-appropriately immunized to attend school in New York State. The number of doses depends on the schedule recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Intervals between doses of vaccine must be in accordance with the ["ACIP-Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule."](#) Doses received before the minimum age or intervals shown on the schedule are not valid and do not count toward the number of doses listed below. See footnotes for specific information for each vaccine. Children who are enrolling in gradeless classes must meet the immunization requirements of the grades for which they are age equivalent.

Dose requirements MUST be read with the footnotes of this schedule

Vaccines	Pre-Kindergarten (Day Care, Head Start, Nursery or Pre-K)	Kindergarten and Grades 1, 2, 3, 4 and 5	Grades 6, 7, 8, 9, 10 and 11	Grade 12
Diphtheria and Tetanus toxoid-containing vaccine and Pertussis vaccine (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 doses	5 doses or 4 doses if the 4th dose was received at 4 years or older and the series was started at less than 1 year of age or 3 doses if 7 years or older and the series was started at 1 year or older	3 doses	
Tetanus and Diphtheria toxoid-containing vaccine and Pertussis vaccine adolescent booster (Tdap) ³		Not applicable	1 dose given after age 10 years	
Polio vaccine (IPV/OPV) ⁴	3 doses	4 doses or 3 doses if the 3rd dose was received at 4 years or older		
Measles, Mumps and Rubella vaccine (MMR) ⁵	1 dose		2 doses	
Hepatitis B vaccine ⁶	3 doses	3 doses or 2 doses of adult hepatitis B vaccine (Recombivax) for children who received the doses at least 4 months apart and between the ages of 11 years through 15 years		
Varicella (Chickenpox) vaccine ⁷	1 dose		2 doses	
Meningococcal conjugate vaccine (MenACWY) ⁸		Not applicable	Grades 7, 8, 9, 10 and 11: 1 dose	Grade 12: 2 doses or 1 dose if the dose was received at 18 years or older
Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (Hib) ⁹	1 to 4 doses		Not applicable	
Pneumococcal Conjugate vaccine (PCV) ¹⁰	1 to 4 doses		Not applicable	



Department
of Health